

## **Prospecto: información para el usuario**

### **Alcomon reforzado 96° solución cutánea** Alcohol 96°/ cloruro de cetilpiridinio

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Alcomon reforzado 96° y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Alcomon reforzado 96°
3. Cómo usar Alcomon reforzado 96°
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Alcomon reforzado 96°
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Alcomon reforzado 96° y para qué se utiliza**

Antiséptico de la piel.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días.

#### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Alcomon reforzado 96°**

No use Alcomon reforzado 96°

**Si es alérgico a los principios activos de este medicamento (incluidos en la sección 6).**

No aplicar sobre heridas profundas y extensas, ni mucosas.

#### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Alcomon reforzado 96°.

Proteger del calor. Fácilmente inflamable. Mantener el recipiente bien cerrado.

No fumar durante su aplicación.

No poner en contacto con las mucosas.

El uso prolongado puede producir irritación y sequedad en la piel.

Puede producir dermatitis de contacto.

No aplicar sobre heridas, porque irrita el tejido dañado y porque puede formar un coágulo que protege a las bacterias resistentes.

Evitar el contacto con los ojos. Si accidentalmente se produjese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y consultar a un oftalmólogo si fuese necesario.

#### **Embarazo**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que pudiera estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

### **Conducción uso de máquinas**

La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

### **3. Cómo usar Alcomon reforzado 96°**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

#### **Uso cutáneo. Solo para uso externo. NO INGERIR.**

**Aplicar directamente sobre el área a tratar, dejar actuar 2 minutos antes de cualquier procedimiento.**

Se recomienda lavar las manos después de cada aplicación.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

#### **Si usa más Alcomon reforzado 96° del que debe**

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### **4. Posibles efectos adversos**

**Al igual que todos los medicamentos, este medicamento, puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.**

El uso prolongado puede producir irritación y sequedad de piel.

#### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es).


Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### **5. Conservación de Alcomon reforzado 96°**

**Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.**

**No conservar a temperatura elevadas, es fácilmente inflamable. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.**

**No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.**

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües, ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

Composición por 100 ml de Alcomon reforzado 96°:

**El principio activo es etanol 96% (alcohol 96°) y cloruro de cetilpiridinio.**

Cada ml de solución contiene 0,99 ml de etanol al 96% (alcohol 96°) y 0,01mg de cloruro de cetilpiridinio.  
Cada 100ml de solución contiene 99,9ml de etanol al 96% (alcohol 96°) y 0,1g de cloruro de cetilpiridinio

No tiene otros componentes (excipientes).

Aspecto del producto y contenido del envase

Solución cutánea transparente.

**Se presenta en envases transparentes de 250ml, 500ml y 1000ml de polietileno provisto de tapón y obturador.**

Información adicional

**En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.**

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

**LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.**

**Gran Capitán 10,**

**08970 Sant Joan Despí (Barcelona)**

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Octubre 2017**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.